

## Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus

Syv lægemiddelgrupper optræder ofte i alvorlige sager om utilsigtede hændelser (UTH'er). De kaldes "Risikosituationslægemidler".



De syv lægemiddelgrupper, der skal få dig til at stoppe op, er:

- **Antidiabetika** (insulin og perorale antidiabetika) (medicin mod diabetes)
- **Antikoagulantia** (warfarin, hepariner, nye orale AK-lægemidler (NOAK)) (blodfortyndende medicin)
- **Lavdosis methotrexat** (middel mod kræft, gigt og psoriasis)
- **Kalium** (kaliumklorid, kaliumphoshat)
- **Opioider** (fx morfin, fentanyl, metadon, oxycodon) (stærk smertestillende medicin)
- **Gentamicin** (antibiotika, bruges ved fx sepsis (blodforgiftning))
- **Digoxin** (mod forstyrrelser i hjerterytmen).

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed & Medicin.dk i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet (DRUM).

Lægemiddelgruppe	Typiske fejl	Konsekvens
Antidiabetika (mod diabetes)	a) Langsomtvirkende og hurtigtvirkende insulin forveksles b) Der tages ikke aktion på de blodsukkerværdier, der findes.	Hyperglykæmi, hypoglykæmi (for højt eller for lavt blodsukker).
Antikoagulantia (blodfortyndende)	a) INR overvåges ikke b) Der gives dobbelt dosis c) Behandling stoppes ikke før operation.	Hæmoragi, trombose, emboli (blødning, blodpropper).
Methotrexat (lavdosis)	Der gives daglig dosis i stedet for ugentlig dosis.	Immunsuppression (nedsættelse af immunforsvaret).
Kalium	Overdosering, pga. forkert fortyndingsgrad.	Hyperkaliæmi.
Opioider	a) Manglende dosisreduktion hos ældre b) Opioidplaster fjernes ikke, før nyt gives c) Overdosering, pga. regnefejl og forveksling af styrker.	Respirationsdepression (påvirkning af vejrtrækningen).
Gentamicin	Overdosering, pga. manglende overvågning af plasmakoncentrationen.	Påvirket nyrefunktion.
Digoxin	Overdosering og forveksling.	Arytmi (hjerterytmeforstyrrelser).

Læs mere om de syv lægemiddelgrupper på [pro.medicin.dk](http://pro.medicin.dk)