


Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus

Syv lægemiddelgrupper optræder ofte i alvorlige sager om utilsigtede hændelser (UTH'er). De kaldes "Risikosituationslægemidler".

De syv lægemiddelgrupper, der skal få dig til at stoppe op, er:

- **Antidiabetika** (insulin og perorale antidiabetika) (medicin mod diabetes)
- **Antikoagulantia** (warfarin, hepariner, nye orale AK-lægemidler (NOAK)) (blodfortyndende medicin)
- **Lavdosis methotrexat** (middel mod kræft, gigt og psoriasis)
- **Koncentreret kalium** (kaliumklorid, kaliumphoshat)
- **Opioider** (fx morfin, codein, fentanyl, metadon, oxycodon) (stærk smertestillende medicin)
- **Gentamicin** (antibiotika, bruges ved fx sepsis (blodforgiftning))
- **Digoxin** (mod forstyrrelser i hjerterytmen).



Kilde: Listen over risikosituationslægemidler udarbejdes - og opdateres årligt - af Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet (DRUM).

Lægemiddelgruppe	Typiske fejl	Konsekvens
Antidiabetika (mod diabetes)	a) Langsomtvirkende og hurtigtvirkende insulin forveksles b) Der tages ikke aktion på de blodsukker-værdier, der findes.	For højt og især for lavt blodsukker
Antikoagulantia (blodfortyndende)	a) INR overvåges ikke b) Der gives dobbelt dosis c) Behandling stoppes ikke før operation.	Blødning, blodpropper
Methotrexat (lavdosis)	Der gives daglig dosis i stedet for ugentlig dosis.	Svær nedsættelse af immunforsvaret
Kalium (koncentreret)	Overdosering.	For høj kaliumkoncentration i blodet
Opioider	a) Opioidplaster fjernes ikke, før nyt gives b) Man afventer ikke virkning, før næste dosis gives.	Påvirkning af vejrtrækningen
Gentamicin	Overdosering.	Påvirket nyrefunktion
Digoxin	Overdosering.	Svær hjerterytmeforstyrrelse

Læs mere på pro.medicin.dk, eller se artiklen "Syv risikosituationslægemidler, der kræver din særlige opmærksomhed" på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside; www.stps.dk.