


Vil du være med til at undgå fejl med medicin?



Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus

Insulin

Vær opmærksom på, at doseringen af insulin afhænger af værdien af borgerens blodsukker. Undgå forveksling af insulinpenne.

Blodfortyndende medicin

Vær opmærksom ved operation - er noget ændret i behandlingen?
Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.

Digoxin

Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

Gentamicin

Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.
Vær opmærksom ved nedsat nyrefunktion.

Kalium

Vær opmærksom på, at oral opløsning ikke må gives i.v.
Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

Methotrexat

Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis.
Overdosering kan være dødelig.

Opioider

Vær opmærksom på symptomer på overdosering; virker borgeren sløv, træt eller forvirret? Husk at fjerne det gamle opioidplaster, før du sætter et nyt på huden.



STYRELSEN FOR
PATIENTSIKKERHED

[Stps.dk/stoptaentjek](https://stps.dk/stoptaentjek)



#stoptaentjek

pro.medicin

[Pro.medicin.dk/stoptaentjek](https://pro.medicin.dk/stoptaentjek)